

Бронхоскопия. Подготовка

Сначала пациент дает согласие на выполнение всех манипуляций. Врач подробно рассказывает о том, как проводится процедура. На консультации пациент может задать специалисту любые возникшие вопросы, уточнить, как проходит бронхоскопия легких под наркозом, например.

Важно!

Пациент должен сообщить врачу:

- О сопутствующих заболеваниях (аллергических реакциях, сахарном диабете и др.)
- О принимаемых препаратах. Особенно важно получить рекомендации специалиста при употреблении инсулина или антикоагулянтов

Перед бронхоскопией выполняют обследование, включающее рентген/МСКТ легких, ЭКГ, анализ крови, заключение терапевта, при наличии сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний – консультация кардиолога.

За день до процедуры запрещено употребление алкоголя. Непосредственно обследование выполняют натощак. Поэтому от пищи следует отказаться как минимум за 6 часов до бронхоскопии. Прием небольшого количества жидкости разрешен за 2-3 часа до исследования. Если процедура планируется в утренние часы, легкий ужин (с легко перевариваемыми продуктами) допускается не позднее 18 часов.

Важно! Перед бронхоскопией запрещено курить!

Уже в кабинете врач попросит пациента снять зубные протезы, контактные линзы, пирсинг, конструкции для исправления прикуса (капы/ретенеры).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ к плановой бронхоскопии:

Абсолютные

- некорригируемая гипоксемия;
- декомпенсированная дыхательная недостаточность;
- нестабильная стенокардия;
- неконтролируемая аритмия сердечных сокращений.

Относительные

- необъяснимая или тяжелая гиперкапния;
- обострение бронхиальной астмы, астматический статус;
- неконтролируемая коагулопатия;
- нестабильность шейного отдела позвоночника;
- декомпенсированная недостаточность кровообращения;

- тяжелая дыхательная недостаточность
- тромбоцитопения менее 50000/мкл

Особые условия и ситуации при выполнении бронхоскопии:

- Диагностическая бронхоскопия не должна выполняться при обострении ХОБЛ;
- При наличии кардиальной патологии перед бронхоскопией необходима консультация кардиолога;
- После инфаркта миокарда диагностическая бронхоскопия должна быть отложена минимум на 4 недели.