



MEDICA

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

ООО «Медика Нск»

654007, Россия, 630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Добролюбова, здание 2/1

e-mail: info_nsk@gm.clinic

ИНН/КПП 5406758500 / 421701001

+ 7 (383) 390-00-03

Подготовка к компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, рентгенологическому исследованию:

- для прохождения исследования необходима медицинская документация (направление от врача, выписки о заболевании и лечении), данные предыдущих исследований области сканирования если выполнялись ранее (описание, заключение, диск/флеш-карта с данными исследования),
- для исследований с контрастированием креатинин крови.

Последний приём пищи (для контрастных исследований) за 2-4 часа до исследования (при магнитно-резонансной холангиопанкреатографии (МРХПГ) – за 6 часов).

Для магнитно-резонансной томографии органов таза – за 2-3 дня до исследования исключить продукты с повышенным газообразованием, за 4 часа до исследования опорожнить кишку естественным путем (без использования клизм и микроклизм), за 1 час до исследования опорожнить мочевой пузырь, за 30-40 минут до исследования принять 2 таблетки «Но-шпа», либо «Дротаверин», либо «Бускопан», либо 2 капсулы «Эспумизан», все лекарственные препараты следует принимать при отсутствии противопоказаний.

Обязательно принимать лекарственные препараты, которые были ранее назначены, отменять их не нужно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ к КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ:

- беременность (только по показаниям после консилиума врачей),
- аллергия на йод при исследованиях с контрастированием, скорость клубочковой фильтрации ниже 30 (при высоком креатинине крови).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ к МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ:

- кардиостимулятор, нейростимулятор, программируемые и инфузионные медицинские устройства и компоненты, металлический клапан сердца, магнитные металлические фрагменты в теле,
- стенты в сосудах, клипсы и спирали в аневризмах сосудов, импланты внутреннего уха – могут быть условным противопоказанием, обязательное наличие выписки с названием имплантированного устройства для проверки МР-совместимости,
- скорость клубочковой фильтрации ниже 30 (при высоком креатинине крови),
- беременность первый триместр.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ к РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ:

- беременность (только по показаниям после консилиума),
- аллергия на йод при исследованиях с контрастированием.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОД НАРКОЗОМ/СЕДАЦИЕЙ - необходима консультация анестезиолога.